

NOTICE D'UTILISATION DE DERMISIL® AF PIED D'ATHLETE

Nettoyez la zone infectée à l'eau et au savon.

Vous devez toujours effectuer un test cutané avant de commencer le traitement.

Séchez complètement la zone : garder votre pied sec est un facteur clef de l'élimination des mycoses du pied d'athlète. Vous pouvez également utiliser du talc ou de la poudre pour bébé après votre traitement, afin de garder cette zone sèche.

Appliquez le liquide Dermisil® AF sur la zone infectée de votre pied à l'aide d'un coton propre ou d'un coton-tige. Faites particulièrement attention aux zones entre les orteils et les membranes du pied. Vous pouvez ressentir une légère brûlure, mais ne vous en inquiétez pas.

Appliquez trois fois ou plus par jour, jusqu'à la totale disparition de la mycose. La mycose devrait commencer à diminuer à partir de 72 heures, en fonction de la sévérité de l'éruption. Le traitement peut durer plusieurs semaines avant d'éliminer totalement la mycose.

Vous pouvez également faire tremper votre pied dans un bain d'eau chaude, en y déposant 20 gouttes de liquide Dermisil® AF. La guérison de votre pied d'athlète pourrait ainsi être accélérée.

N'oubliez pas que vos chaussures ou vos chaussettes peuvent être à l'origine de votre mycose : lavez ou jetez les afin d'assurer votre guérison.

Vous pouvez noter une sécheresse des zones traitées par le liquide. Il s'agit d'un phénomène normal, qui s'atténuera après la fin du traitement.

Les dommages causés par l'infection se dissiperont lentement, en plusieurs jours ou plusieurs semaines, en fonction de la sévérité de l'éruption.

Remarque : les ingrédients actifs Dermisil® AF sont : cymbopogon citratus, melaleuca alternifolia, ainsi que d'autres extraits de plantes antimycosiques.

Ne JAMAIS appliquer le liquide Dermisil® AF sur les enfants de moins de 5 ans, en cas de grossesse ou d'allaitement. Ne JAMAIS appliquer le liquide Dermisil® AF sur les muqueuses ou sur les yeux. Ne JAMAIS ingérer ou boire le liquide Dermisil® AF. Si le liquide Dermisil® AF est ingéré, contactez immédiatement le centre antipoison le plus proche.

NOTICE D'UTILISATION DE DERMISIL® JI DEMANGEAISONS INTIMES

Nettoyez la zone infectée à l'eau et au savon.

Vous devez toujours effectuer un test cutané avant de commencer le traitement.

Séchez complètement la zone : garder vos parties génitales sèches est un facteur clef de l'élimination des mycoses génitales. Vous pouvez également utiliser du talc ou de la poudre pour bébé après votre traitement, afin de garder cette zone sèche.

Appliquez le liquide Dermisil® JI sur la zone infectée de votre pied à l'aide d'un coton propre ou d'un coton-tige. Vous pouvez ressentir une légère brûlure, mais ne vous en inquiétez pas.

Appliquez trois fois par jour ou plus, jusqu'à la totale disparition de la mycose. La mycose devrait commencer à diminuer entre 48 et 72 heures après le début du traitement, en fonction de la sévérité de l'éruption. Le traitement peut durer plusieurs semaines avant d'éliminer totalement la mycose.

Vous pouvez noter une sécheresse des zones traitées par le liquide. Il s'agit d'un phénomène normal, qui s'atténuera après la fin du traitement.

Les dommages causés par l'infection se dissiperont lentement, en plusieurs jours ou plusieurs semaines, en fonction de la sévérité de l'éruption.

Remarque : les ingrédients actifs Dermisil® JI sont : cymbopogon citratus, melaleuca alternifolia, ainsi que d'autres extraits de plantes antimycosiques.

Ne JAMAIS appliquer le liquide Dermisil® JI sur les enfants de moins de 5 ans, en cas de grossesse ou d'allaitement.

Ne JAMAIS appliquer le liquide Dermisil® JI sur les muqueuses ou sur les yeux. Ne JAMAIS ingérer ou boire le liquide Dermisil® JI. Si le liquide Dermisil® JI est ingéré, contactez immédiatement le centre antipoison le plus proche.

<http://www.shytobuy.fr/dermisil-pied-athlete.html>

<http://www.shytobuy.fr/dermisil-infection-ongles.html>

<http://www.shytobuy.fr/dermisil-eczema-magine-hebra.html>

NOTICE D'UTILISATION DE DERMISIL® NI MYCOSES ET INFECTIONS DES ONGLES

Nettoyez la zone infectée à l'eau et au savon.

Vous devez toujours effectuer un test cutané avant de commencer le traitement.

Séchez complètement la zone : garder vos ongles (doigts ou orteils) secs est un facteur clef de l'élimination des mycoses des ongles. Vous pouvez également utiliser du talc ou de la poudre pour bébé après votre traitement, afin de garder cette zone sèche.

Appliquez le liquide Dermisil® NI sur la zone infectée de vos ongles, à l'aide d'un coton propre ou d'un coton-tige. Vous pouvez ressentir une légère brûlure, mais ne vous en inquiétez pas. Assurez vous d'appliquer la solution sous l'ongle également, dans la mesure du possible.

En cas d'infection extrême, vous pouvez faire tremper la zone infectée directement dans les extraits de Dermisil NI, pendant 5-10 minutes.

Appliquez trois fois par jour, jusqu'à la totale disparition de la mycose. La mycose de l'ongle devrait commencer à diminuer après 4 semaines. Le traitement peut durer entre 2 et 6 mois avant d'éliminer l'infection, à cause de la croissance lente de l'ongle. N'oubliez pas que l'ongle doit avoir repoussé sans aucune mycose avant d'être tout à fait sain. Dans le cas contraire, la mycose de l'ongle reviendra. Vous pouvez noter une sécheresse des zones traitées par le liquide. Il s'agit d'un phénomène normal, qui s'atténuera après la fin du traitement.

Vous pouvez également faire tremper vos ongles dans un bain d'eau chaude, en y déposant 20 gouttes de liquide Dermisil® NI. La guérison de votre mycose des ongles pourrait ainsi être accélérée.

Les dommages causés par l'infection se dissiperont lentement, en plusieurs jours ou plusieurs semaines, en fonction de la sévérité de l'éruption.

Remarque : les ingrédients actifs Dermisil® NI sont : cymbopogon citratus, melaleuca alternifolia, ainsi que d'autres extraits de plantes antimycosiques.

Ne JAMAIS appliquer le liquide Dermisil® NI sur les enfants de moins de 5 ans, en cas de grossesse ou d'allaitement. Ne JAMAIS appliquer le liquide Dermisil® NI sur les muqueuses ou sur les yeux. Ne JAMAIS ingérer ou boire le liquide Dermisil® NI. Si le liquide Dermisil® NI est ingéré, contactez immédiatement le centre antipoison le plus proche.